

Листок-вкладыш – информация для потребителя


ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ 20 000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой *Мультиэнзим (multienzymes) (lipase, protease etc.)*

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат предназначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША:

1. Что из себя представляет препарат Панзинорм форте 20 000, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата Панзинорм форте 20 000
3. Применение препарата Панзинорм форте 20 000
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Панзинорм форте 20 000
6. Содержимое упаковки и прочие сведения



1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ 20 000, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Панзинорм форте 20 000 содержит высокоактивные природные ферменты поджелудочной железы - липазу, амилазу и протеазу. Эти вещества обычно высвобождаются в тонком кишечнике во время приема пищи, и расщепляют отдельные пищевые компоненты. Липаза обеспечивает метаболизм жиров, амилаза - метаболизм углеводов и протеаза участвует в метаболизме белков. Панзинорм форте 20 000 содержит компоненты свиного происхождения, практически идентичные тем, которые содержатся в организме человека.

Панзинорм форте 20 000 рекомендуется применять при длительной недостаточности секреции ферментов поджелудочной железы.

Таблетки имеют специальную кислотоустойчивую оболочку. Ферменты высвобождаются в тонком кишечнике, где они компенсируют дефицит ферментов поджелудочной железы.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ 20 000

Не принимайте Панзинорм форте 20 000:

- При наличии аллергии на липазу, амилазу, протеазы или любой из ингредиентов препарата (см. раздел 6).
- При гиперчувствительности к свиным белкам.
- Если у вас острое воспаление поджелудочной железы или обострение хронического воспаления поджелудочной железы (панкреатит).

Панзинорм форте 20 000 может применяться у детей с муковисцидозом с 15 лет.

Особые указания и меры предосторожности



Перед приемом препарата Панзинорм форте 20 000 проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Оболочка таблетки предотвращает повреждение слизистой оболочки ротовой полости активными панкреатическими ферментами и защищает ферменты от воздействия желудочного сока. Таблетки следует проглатывать целиком.

Очень редко у пациентов с муковисцидозом, которые принимают высокую дозу панкреатических ферментов, могут развиваться стриктуры (сужение) толстого кишечника. В качестве меры предосторожности следует оценить все необычные абдоминальные симптомы или изменения абдоминальных симптомов.

Дети

Безопасность применения препарата у детей не изучалась.

Другие препараты и Панзинорм форте 20 000

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если вы принимаете, недавно принимали или могли принимать какие-либо другие лекарственные средства.

Панкреатические ферменты могут снижать абсорбцию фолиевой кислоты и железа, и могут уменьшить эффективность акарбозы и миглитола. Ингибиторы H₂ рецепторов и ингибиторы «протонной помпы» усиливают действие панкреатических ферментов.

Панзинорм форте 20 000 с пищей и напитками

Панзинорм форте 20 000 принимают во время еды с достаточным количеством жидкости.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете беременность, проконсультируйтесь с лечащим врачом прежде, чем принимать Панзинорм форте 20 000. Риск не может быть исключен. Применение препарата показано, если потенциальная польза для матери оправдывает потенциальный риск для ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние на психофизическое состояние не установлено.

Панзинорм форте 20 000 содержит лактозу.

Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем принимать этот лекарственный препарат.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ 20 000

Всегда принимайте препарат в точном соответствии с назначением врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если вы не уверены.

Принимайте Панзинорм форте 20 000 во время еды. Проглатывайте таблетки целиком, запивая достаточным количеством жидкости. Таблетки не разжевывают и не раскусывают.

Принимайте самые низкие дозы, которые уменьшают ваши симптомы (которые регулируют ваши частоту и характер стула, и массу тела). Начинайте лечение, принимая одну таблетку во время основных приемов пищи. Если этого недостаточно, вы можете увеличить дозы. Обычно достаточно принимать от одной до двух таблеток во время основного приема пищи (три раза в день). При необходимости можно принимать одну таблетку во время перекусов.

Вы должны регулярно принимать препарат.

Применение у детей

Детям следует давать меньшие дозы препарата.

Если вы приняли препарата Панзинорм форте 20 000 больше, чем следовало



Нет данных, свидетельствующих о том, что передозировка вызывает системную интоксикацию, но могут возникнуть диарея, перианальное раздражение и кишечная непроходимость. Уровень мочевой кислоты в крови и моче может быть повышен.

Если вы забыли принять препарат Панзинорм форте 20 000

Если вы забыли принять дозу препарата во время еды, подождите до следующего приема пищи и следуйте своему обычному графику дозирования.

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если вы прекратили прием препарата Панзинорм форте 20 000

Если Вы прекратите прием Панзинорм форте 20 000, заболевание может возобновиться.

Если у вас возникли дополнительные вопросы касательно приема препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным средствам Панзинорм форте 20 000 может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Редкие нежелательные реакции (могут возникнуть у не более 1 из 1000 человек) включают тошноту, рвоту, боль в животе, диарея, запор, периоральное или перианальное раздражение кожи. Данные реакции имеют мягкий характер и не требуют прекращения лечения.

Очень редкие нежелательные реакции (могут возникнуть у не более 1 из 10000 человек) включают тяжелые аллергические реакции, для которых необходима неотложная медицинская помощь. В случае появления сыпи, зуда или затруднения дыхания, прекратите прием препарата и обратитесь к вашему врачу или в ближайшее отделение скорой помощи.

Это могут быть аллергические реакции Панзинорма форте 20 000. Если вы испытываете сильное вздутие живота, боль и сильные кишечные спазмы, немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью, так как есть вероятность кишечной непроходимости.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ 20 000

Лекарственное средство не требует особых условий хранения.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.


Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в водопровод или канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не требуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Состав препарата Панзинорм форте 20 000





1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит панкреатин свиной с энзимной активностью липазы 20000 ЕД ЕФ, амилазы 12000 ЕД ЕФ, протеазы 900 ЕД ЕФ.
Вспомогательные ингредиенты: лактоза моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, гипромеллоза, метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер, триэтилцитрат, титана диоксид (Е 171), тальк, симетикон – эмульсия, ароматизатор ванилин 501345 С, ароматизатор бергамот 501356 Т, макрогол 6000, кармеллоза натрия и полисорбат 80.
См. раздел 2 «Панзинорм форте 20 000 содержит лактозу».

Внешний вид препарата Панзинорм форте 20 000 и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Гладкие, круглые, двояковыпуклые, ароматизированные, белого или светло-серого цвета таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистере (ОПА/А1/ПВХ пленка и А1 фольга). 1 или 3 блистера с листком-вкладышем в картонной коробке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

КРКА д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

