

Листок-вкладыш – информация для потребителя

СептаНазал® для взрослых 1 мг / 50 мг в 1 мл назального спрея
Ксилометазолина гидрохлорид / Декспантенол

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точном соответствии с данным листком-вкладышем или с назначением врача или работника аптеки.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Обратитесь к работнику аптеки, если вам необходима дополнительная информация или рекомендация.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Вы должны обратиться к врачу, если через 7 дней лечения не почувствовали улучшение или стали чувствовать себя хуже.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША:

1. Что из себя представляет препарат СептаНазал® для взрослых, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата СептаНазал® для взрослых
3. Применение препарата СептаНазал® для взрослых
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата СептаНазал® для взрослых
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ СЕПТАНАЗАЛ® ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

СептаНазал® для взрослых – комбинированный назальный спрей, который содержит активные компоненты ксилометазолина гидрохлорид и декспантенол.

Ксилометазолин гидрохлорид вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки носа, устраняет отек слизистой оболочки носа и уменьшает выделения из носа. Благодаря этому восстанавливается носовое дыхание. Декспантенол – производное пантотеновой кислоты (витамина В5), защищает и способствует заживлению повреждений слизистой оболочки носа.

СептаНазал® для взрослых используется:

- для уменьшения отека слизистой оболочки носа при ринитах
 - для поддерживающего лечения для заживления повреждений слизистой оболочки носа,
 - для облегчения состояния при вазомоторном рините,
 - для восстановления носового дыхания после хирургического вмешательства в носовой полости.
- Препарат рекомендован взрослым и детям старше 6 лет.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА СЕПТАНАЗАЛ® ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ


Не принимайте СептаНазал® для взрослых, если у вас или вашего ребенка:

- повышенная чувствительность к ксилометазолину гидрохлориду, декспантенолу или к любому из вспомогательных веществ препарата, которые перечислены в разделе 6;
- сухое воспаление слизистой оболочки носа с образованием корок (сухой ринит);

9184 - 2021

- проводилось хирургическое удаление гипофиза или другие хирургические вмешательства на мозговых оболочках (слизистых оболочках мозга).

СептаНазал® для взрослых противопоказан детям младше 6 лет.



Особые указания и меры предосторожности

Перед использованием СептаНазал® для взрослых, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если у вас или вашего ребенка

- есть необходимость в терапии ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) или препаратами, которые могут повышать артериальное давление,
- повышено внутриглазное давление (глаукома), особенно при закрытоугольной глаукоме,
- тяжелые заболевания сердца и органов кровообращения (например, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, синдром удлиненного интервала QT)
- опухоль надпочечника (феохромоцитом),
- нарушение обмена веществ (например, повышенная активность щитовидной железы, сопровождающаяся повышенным потоотделением, повышением температуры тела и частоты сердечных сокращений, диабет),
- болезнь, связанная с нарушением обмена веществ под названием порфирия,
- увеличение предстательной железы.

Применение препарата в случае хронического ринита возможно только под наблюдением врача, поскольку существует вероятность развития атрофии слизистой оболочки носа.

При несоблюдении инструкции по применению могут возникнуть нежелательные реакции (см. п.4).

Длительное использование или передозировка препарата может привести к хроническому отеку и возможному истончению (повреждению) слизистой оболочки носа.

Не рекомендован одновременный прием спрея и лекарственных препаратов, содержащих псевдоэфедрин, эфедрин, фенилэфрин, оксиметазолин, ксилометазолин, трамазолин, нафазолин, туаминогептан.

При одновременном применении повышается риск возникновения нежелательных реакций со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Следует избегать попадания препарата в глаза.

Применение у детей

Не следует превышать рекомендуемые дозы.

Рекомендовано проконсультироваться с врачом относительно продолжительности терапии и особенностей дозирования у детей.

СептаНазал® для взрослых предназначен для взрослых и детей от 6 лет. Детям младше 6 лет рекомендован СептаНазал® для детей, содержащий более низкую дозу действующего вещества.

Применение препарата у детей младше 12 лет должно проводиться под наблюдением взрослых.


Если после 3 дней лечения улучшения состояния ребенка не наблюдается или ребенок чувствует себя хуже, следует проконсультироваться с врачом.

Другие препараты и СептаНазал® для взрослых

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, какие лекарственные препараты вы принимаете, принимали недавно или собираетесь принимать.

Следует избегать одновременного использования СептаНазал® для взрослых с лекарствами, предназначенными для снижения артериального давления (например, метилдопа) из-за возможного действия ксилометазолина на артериальное давление.

Одновременное использование СептаНазал® для взрослых с некоторыми препаратами для лечения депрессии (ингибиторами моноаминоксидазы или трициклическими антидепрессантами), а также с препаратами, повышающими артериальное давление, может привести к повышению артериального давления.




9184 - 2021

При одновременном применении СептаНазал® для взрослых с лекарственными препаратами, содержащими псевдоэфедрин, эфедрин, фенилэфрин, оксиметазолин, ксилометазолин, трамазолин, нафазолин, туаминогептан, повышается риск возникновения нежелательных реакций со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием СептаНазал® для взрослых, если вы или ваш ребенок получает любое из вышеупомянутых лекарств.

СептаНазал® для взрослых с едой и напитками

Вы можете использовать препарат независимо от приемов пищи.



Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не рекомендовано применять препарат в период беременности в связи с отсутствием достаточного количества данных по безопасности.

Не рекомендовано применять препарат в период лактации, поскольку неизвестно, выделяется ли ксилометазолина гидрохлорид в грудное молоко.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При применении в соответствии с рекомендациями препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и работать со сложными механизмами.

СептаНазал® для взрослых содержит натрий

Препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия, т.е. фактически без содержания натрия.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СЕПТАНАЗАЛ® ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Всегда принимайте СептаНазал® для взрослых в полном соответствии с рекомендациями данного листка-вкладыша, лечащего врача или работника аптеки. Если у Вас имеются сомнения, посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза для взрослых и детей от 6 лет - одно впрыскивание СептаНазал® для взрослых в каждый носовой ход до 3 раз в день. Доза зависит от индивидуальной чувствительности и клинической эффективности.


Продолжительность лечения:

Не применяйте препарат более 7 дней. Повторный курс возможен после перерыва в несколько дней. Всегда консультируйтесь с врачом относительно продолжительности лечения у детей.

Способ применения


Снять защитный колпачок с распылителя.

Перед первым применением, а также, если спреем не пользовались в течение длительного периода времени, следует несколько раз нажать на распылитель до появления оптимального потока.



9184 - 2021

Верхнюю часть (наконечник) распылителя следует ввести в вертикальном положении в носовой ход и однократно нажать на распылитель. В момент впрыскивания пациенту следует произвести легкий вдох через нос. При необходимости процедуру следует повторить с другим носовым ходом. После каждого применения наконечник распылителя следует протереть бумажной салфеткой и закрыть колпачком.



СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

При повышенном внутриглазном давлении (глаукома), особенно при закрытоугольной глаукоме, перед применением следует проконсультироваться с врачом.

Если вы приняли препарата СептаНазал® для взрослых больше, чем следовало

Если вы превысили рекомендуемую дозу или случайно приняли перорально (внутри) большое количество препарата возможны следующие нежелательные эффекты: сужение зрачков (миоз), расширение зрачков (мидриаз), лихорадочное состояние, повышенное потоотделение, бледность кожных покровов, синюшная окраска губ (цианоз), тошнота, судороги, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (увеличение или уменьшение частоты сердечных сокращений, нарушение сердечного ритма, остановка сердечной деятельности, гипертензия), респираторные нарушения (отек легких, нарушение функции дыхания), психические расстройства.

Кроме того, в случае превышения рекомендуемых доз или случайного приема перорально (внутри) больших количеств препарата возможны сонливость, понижение температуры тела, снижение артериального давления, нарушение функции дыхания и кома.

При появлении любого из перечисленных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

Если вы забыли принять препарат СептаНазал® для взрослых

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого препарата, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным средствам препарат может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Нечастые (могут возникнуть менее чем у 1 из 100 человек):


- реакции гиперчувствительности (кожная сыпь, зуд, отек кожи и слизистых оболочек).

Редкие (могут возникнуть менее чем у 1 из 1000 человек):

- ощущение сердцебиения, тахикардия (учащенное сердцебиение), гипертензия (повышенное артериальное давление).

Очень редкие (могут возникнуть менее чем у 1 из 10000 человек):

- возбужденное состояние, бессонница, галлюцинации (главным образом, у детей);
- усталость (сонливость, вялость), головная боль;



- аритмия;
 - отек слизистой оболочки носа (после прекращения лечения), носовое кровотечение;
 - судороги (преимущественно у детей).
- Частота неизвестна (частота не может быть определена на основании имеющихся данных):*
- жжение и сухость слизистой оболочки носа, чихание.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СЕПТАНАЗАЛ® ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

До вскрытия флакона: хранить при температуре не выше 25 °С.

После вскрытия флакона: хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 12 месяцев.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в водопровод или канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не требуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат СептаНазал® для взрослых содержит

Действующие вещества: 1 мл назального спрея содержит 1 мг ксилометазолина гидрохлорида и 50 мг декспантенола. 1 доза при однократном нажатии составляет 0,1 мл назального спрея и содержит 0,1 мг ксилометазолина гидрохлорида и 5,0 мг декспантенола.

Вспомогательные вещества:

калия дигидрофосфат,
динатрия фосфат додекагидрат,
вода очищенная.

См. раздел 2 «СептаНазал® для взрослых содержит натрий».

Внешний вид препарата СептаНазал® для взрослых и содержимое упаковки

Спрей назальный, дозированный. Прозрачная, бесцветная жидкость.

Пластиковый флакон (ПЭВП) белого цвета с помпой белого цвета и полупрозрачным пластиковым колпачком: 10 мл назального спрея, в коробке, с листком-вкладышем. 10 мл назального спрея соответствуют не менее чем 90 распылениям.

9184 - 2021

Флакон спрея закрывается распылительным насосом, который защищает раствор от контаминации во время использования.

Условия отпуска

Без рецепта врача

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

КРКА д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

Представитель держателя регистрационного удостоверения в Республике Беларусь

Представительство Акционерного Общества «KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D. D., NOVO MESTO» (Республика Словения) в Республике Беларусь: ул. Филимонова 25Г, офис 315, 220114, г. Минск, Республика Беларусь, Тел/факс: +375 740 740 9230, E-mail: info.by@krka.biz.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь